

Оценка риска возникновения вторичных осложнений¹

Примечание при оценке учитываются качество типичной позы, обычное поведение и типичные проблемы, возникающие при уходе.

Фамилия, имя _____

Риск появления деформаций и контрактур	Да - 0	Нет - 1
<u>Положение лежа на спине</u>		
Туловище симметрично		
Голова по средней линии		
Ноги выпрямлены и лежат параллельно		
Вес распределен равномерно между правой и левой половинами тела		
<u>Положение сидя</u>		
Туловище симметрично		
Голова по средней линии		
Ноги параллельно друг другу		
Таз в нейтральном положении или наклонен вперед		
Стопы стоят на поверхности опоры		
Клиент не более 3-х часов в день находится в позе опасной с точки зрения возникновения деформаций и контрактур		
Клиент способен по своему желанию самостоятельно поменять позу		
Клиент сигнализирует о чувстве дискомфорта или желании поменять позу		
Риск аспирации и респираторных инфекций	Нет - 0	Да - 1
Поперхивается при проглатывании пищи		
Поперхивается при проглатывании питья		
Клиента кормят и поят в положении лежа или полулежа		
Количество респираторных инфекций за 1 год	0 1 2 3 4 5 6 7 8	
Риск появления повреждения мягких тканей и пролежней	Нет - 0	Да - 1
Клиент более 6 часов в день находится в стуле или коляске		
Заметно покраснение кожи в точках прижатия или травматизации		
ИТОГО		

¹ © Клочкова Е.В., 2006, 2011